


پورت گذاری یا گذاشتن کاتتر پورت برای شیمی درمانی

پورت گذاری در کشورهای پیشرفته جهان برای شیمی درمانی بیماران از تخریب رگ های محیطی و ایجاد مشکلاتی بیشتر برای بیماران جلوگیری می کند. تزریق مکرر در افرادی که نیاز به شیمی درمانی دارند، باعث سوراخ کردن رگ های مختلف آنها و همچنین سوزش، درد و سرخي پوست بدن می شود که علاوه بر این موارد باعث از دست دادن رگ های محیطی و مشکلات جدیدی برای این بیماران می شود. یک لوله ی فلزی یا پلاستیکی زیر پوست فرد بیمار کاشته شده و از راه یک لوله به رگ مرکزی بدن وصل و تزریقات وریدی مثل شیمی درمانی به راحتی به وسیله آن انجام می گیرد.

محل پورت گذاری و کارگذاری کاتتر پورت



جراحی پورت گذاری

جراحی پورت گذاری سرپایی می باشد که بعد از چند ساعت بیمار می تواند به منزل برگردد و در شرایطی استریل در اتاق عمل و با بی حسی موضعی زیر پوست کار گذاشته می شود و با استفاده از نخ قابل جذب از طریق شیوه پلاستیک بازسازی می شود.

اگر فرد بیمار به درستی از پورت مراقبت کند تا انتهای دوره شیمی درمانی و تا ماه ها در صورت لزوم قابل استفاده می باشد

مزایای پورت گذاری

- از مزایای گذاشتن پورت شیمی درمانی می توان گفت :
- پورت ها در زیر پوست قرار گرفته اند و در نتیجه آلودگی به آن نفوذ نمیکنند.
 - بیمار روز بعد از جراحی هم می تواند به راحتی به کارهای روزمره روزانه و شستشوی بدن بپردازد
 - اثرات دارویی مثل سفت و طنابی کردن رگ های محیطی را ندارد و سیاهرگ های مرکزی کمتر صدمه می بینند.
 - همچنین بیماران از رگ گیری رهایی می یابند.
 - سوزن پورت با توجه به محل قرارگیری پورت می تواند تا ده روز در آن قسمت بماند و در نتیجه نیازی به سوزن گذاری مجدد نمی باشد.

پورت گذاری برای نوزادان و کودکان

نوزادان و کودکان دچار سرطان رگهایی نازک و آسیب پذیر دارند. رگ گیری های پیایی حتی روی خلق و خوی آنها تاثیر منفی می گذارد. پورت علاوه بر تأمین امنیت لازم برای انجام تزریقات و خونگیری، در کاهش استرس های کودکان بسیار موثر می باشند.

پورت گذاری در خانم های مبتلا به سرطان سینه خانم هایی که مبتلا به سرطان سینه دو طرفه هستند و **عمل جراحی سرطان سینه** انجام داده اند، این وسیله بسیار کاربردی و مفید است به این دلیل که رگ گیری از دست در این نوع بیماران ممنوع است.

نحوه استفاده از پورت

هر بار که بیمار نیاز به تزریق داشته باشد، دارو از طریق - سوزنی که به برگه سیلیکونی وارد شده، به محفظه میرود و از آنجا به دهلیز راست قلب هدایت میشود

پیش از هر تزریق، پوست روی پورت ضد عفونی شده سپس سوزن بطور عمودی وارد پورت می شود. پس از تزریق دارو باید پورت بوسیله محلول فیزیولوژیک (سرم نمکی ۰.۵٪) شسته شود و محلولی از هپارین را برای جلوگیری از لخته شدن خون درون لوله داخل پورت تزریق کرد.

نکاتی درباره مراقبت از پورت کت:


با توجه به این که پورت کاملاً در زیر پوست قرار گرفته، معمولاً در بین دو استفاده از آن احتیاج به مراقبت خاصی ندارد ولی بعد از هر استفاده حتماً باید با سرم هپارینه، کاتتر و پورت شستشو داده شود و اگر فاصله دو استفاده از یک ماه بیشتر است این کار باید تکرار شود.

-پس در صورت عدم استفاده، هر ۶ هفته با ۲۵۰۰ واحد هپارین رقیق شده، مسیر پورت شستشو شود.

-اگر بیمار احساس کند که پورت جابجا شده است و یا در محل پورت تورم، درد، قرمزی و یا افزایش حرارت احساس کند، حتماً باید به پزشک خود اطلاع دهد.



بیمارستان فوق تخصصی مدائن



سلامتی روز افزون شما آرزوی ماست

راهنمای پورت کت

واحد آموزش سلامت-۱۴۰۱

MA-EP-PA-12-01

برای دسترسی آسان به اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان کد QRS را دانلود کنید.



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن
تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولی عصر،
خیابان صبا جنوبی
تلفن: ۶۶۴۰۵۷۰۵-۸ و ۶۶۴۶۵۳۵۵
وب سایت WWW.Madaen.hospital.COM

سوالات رایج در مورد پورت کت:

- ۱- پورت کت تا چه موقع باید در داخل بدن باشد؟
معمولاً تا پایان دوره درمان؛ و بهتر است تا مدتی بعد از اتمام دوره درمانی نیز پورت خارج نشود.
- ۲- آیا وجود پورت محدودیتی نیز برای فرد ایجاد میکند؟
معمولاً نه، ولی باید از انجام حرکاتی که باعث کشش میشوند و میتوانند باعث حرکت و آسیب به پورت شوند مانند شنا، وزنه برداری و گلف خودداری کرد.
- ۳- آیا با پورت کت امکان انجام سی تی اسکن و هست؟ بله، معمولاً اکثر پورت هایی که امروزه استفاده میشوند MRI قابلیت انجام عکسبرداری را دارند، ولی گاهی به جنس پورت استفاده شده بستگی دارد.
- ۴- آیا پورت کت در بازرسی های فرودگاهی مشکلی ایجاد خواهد کرد؟
چون اکثر این دستگاهها میتوانند باعث ایجاد آلارم شوند لازم است که کارت مخصوص پورت کت را حتما همراه خود داشته باشند.
- ۵- پورت تا چه مدت قابلیت استفاده دارد؟
-بطور میانگین، هر پورت قابلیت ۱۰۰۰ تزریق را خواهد داشت.
- ۶- چه مدت پس از کارگذاری، میتوان استفاده از آن را شروع کرد؟
بلافاصله بعد قرار دادن میتوان این کار را شروع کرد. البته در صورت امکان بهتر است حدود ۳ الی ۵ روز از این زمان بگذرد تا درد و التهاب محل عمل کاهش یافته باشد.